

Herbicida LISTO PARA USAR

NICOSULFURON 4% LPU MITO

**Sin malezas,
su maíz es moneda fuerte.**



Nicosulfuron 4% LPU MITO Implacable con las malezas más difíciles.



Nicosulfuron 4% LPU MITO es un herbicida selectivo para el control de gramíneas anuales y perennes, y algunas malezas de hoja ancha en el cultivo de maíz.

Nicosulfuron 4% LPU MITO pertenece al grupo de las sulfonilureas.

Su aplicación debe ser hecha sobre malezas emergidas y en activo crecimiento en buenas condiciones de humedad y temperatura.

La absorción foliar es la principal vía de penetración en la planta.

Actúa rápidamente luego de aplicado, inhibiendo la división celular y deteniendo el crecimiento de las malezas susceptibles. Los primeros síntomas de actividad se podrán ver algunos días más tarde, las hojas se volverán gradualmente cloróticas o violáceas, secándose luego y terminando en la muerte de la planta.

Formulación: Dispersión oleosa. (OD)

Clase toxicológica: Clase III, Banda Azul. Producto ligeramente peligroso.


Presentación: Caja 4 bidones x 5 litros

Para el control de **otras malezas** se pueden realizar mezclas con 2,4 D sólo o su combinación con dicamba o piclorám a las dosis indicadas en sus respectivos marbetes.

Aplicación Dividida: En caso de lotes con **muy alta infestación de sorgo de Alepo**, se recomienda hacer la aplicación dividida de las dosis de **Nicosulfuron 4% LPU MITO**.

1^a aplicación: 650 cc/ha cuando el sorgo de Alepo tenga 10-20 cm de altura.

2^a aplicación: 650 cc/ha, 12 a 15 días después.



Recomendaciones de uso:

Malezas	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Gramíneas Sorgo de Alepo de rizoma (<i>Sorghum halepense</i>)	1,3	Cuando la maleza tenga 20 a 40 cm de altura.
Sorgo de Alepo de semilla	1 a 1,3	Cuando la maleza tenga 15 a 20 cm de altura.
Gramíneas Anuales Capin arroz (<i>Echinochloa crusgalli</i>)	1 a 1,3	1 a 4 hojas a principio de macollaje.
Brachiaria (<i>Brachiaria platyphila</i>)	1 a 1,3	1 a 4 hojas a principio de macollaje y hasta 5 cm de altura.
Pasto cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	1 a 1,3	Con malezas pequeñas, desde 1 a 4 hojas.
Hoja Ancha Nabo (<i>Brassica campestris</i>)	1	Estado de roseta entre 3 y 5 hojas.
Yuto colorado (<i>Amaranthus spp</i>)	1	Cuando la maleza tenga entre 5 y 10 cm de altura.

Nicosulfuron 4% LPU MITO

Se deben respetar los siguientes intervalos entre aplicación y cosecha:

Maíz para grano: 90 días.

Maíz para forraje: 30 días.

No aplicar a maíz sembrado en áreas donde el año anterior se trató con **IMAZAQUIN**.

No aplicar a maíz tratado con insecticidas organofosforados.

→ **Más info:** www.insuagro.com.ar

Nicosulfuron 4% LPU MITO: Control Eficaz de Malezas.