



Herbicida

Revenge ME

Implacable con las malezas más difíciles, con todas las ventajas de la tecnología ME.

Especial
BARBECHO

Fórmula en
Microemulsión
Listo Para Usar

REVENGE ME es un herbicida **post-emergente** utilizado en **Barbecho Químico**, resultado de la combinación de dos herbicidas hormonales auxínicos como el dicamba y 2,4D. Para que expresen al máximo su potencial sinérgico en el control de las **Malezas de Hoja Ancha** más difíciles, como **Rama Negra**.

Composición: 2,4D 30 % + Dicamba 4,8 %

Formulación: Microemulsión, Tecnología ME.

Modo de acción: Grupo 0 (HRAC).

Clase toxicológica: Clase III (Banda Azul).

Presentación: Bidones de 20 litros.

Revenge ME

- Práctico y Conveniente.
- Reducción de costos de logística.
- No necesita adyuvantes, listo para usar. (exclusiva formulación LPU)



→Características Principales.

- Máxima compatibilidad en mezclas con otros herbicidas.
- No tiene olor.
- Ultra Baja Volatilidad.
- Mayor eficacia de control y menor rebrote de Rama Negra.

→Posicionamiento.

- Barbechos Químicos Largos.

→Principales Malezas Que Controla:

- Rama Negra
- Bowlesia
- Ortiga Mansa
- Ortiga Verdadera
- Mastuerzo
- Capsella bursa-pastoris

→Recomendaciones De Uso:

- Específicamente desarrollado para el control de Malezas de Hoja Ancha con registro para el control de Rama Negra (*Conyza spp.*)

Momento de aplicación: Aplicar cuando las malezas se encuentren a principios de su desarrollo vegetativo y creciendo vigorosamente.

► **DOSIS:** 1 -1,7 L/ha + Glifosato + Excelent

Maximizá Su Acción Herbicida / Mezclas Sugeridas:

- **Glifosato:** alta compatibilidad con las diferentes formulaciones presentes en el mercado.
- **Cletodim:** ideal para control de **Rye Grass**, potenciando su control debido a la alta concentración de emulsionates presentes en su formulación.
- **Atrazina / Terbutilazina / Amicarbazone.**
- **Saflufenacil / Carefentrazone.**

Intervalo entre aplicación y siembra de cultivos:

- **Maíz:** 7 días, **Soja:** 21 días, **Girasol y Algodón:** 35 días (con 50 mm de lluvia).
- **Aplicación en Trigo:** en post emergencia, desde inicio hasta fin de macollaje, 1 l/ha.

Siempre en suelos con >1,5% de materia orgánica y <50% de arena.

No está recomendada la aplicación previa a la siembra de los cultivos mencionados anteriormente, en otros tipos de suelos.

- **Barbecho Químico:** hasta 45 días antes de la siembra. En cualquier tipo de suelo.

→ INSUAGRO, más y mejores soluciones para una agricultura sustentable.